

El tabaco sigue siendo la **principal causa de enfermedades prevenibles y muertes prematuras en los Estados Unidos.**

El uso del tabaco es uno de los mayores impulsores de los costos relacionados con la salud. De todos los problemas de salud, las enfermedades crónicas son las más comunes y costosas. También son las más prevenibles.



95% de los adultos fumadores actuales

comenzaron a fumar
antes de los 21 años.



La etapa de 18 a 21 años es un período crítico cuando muchos fumadores pasan de fumar experimentalmente al uso habitual diario.



En 1995, la agencia de Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) declaró que el consumo de tabaco es una

"enfermedad pediátrica"

La Academia Americana de Pediatría y otras organizaciones nacionales de salud de gran reputación también respaldan con entusiasmo esa opinión.

Según la OIM: Con el tiempo, Tabaco 21 logrará...

25%

Disminución del inicio del tabaquismo en jóvenes de 15-17 años

12%

Reducción global en la prevalencia del tabaquismo

10%

Reducción de muertes relacionadas con el tabaquismo

Se salvarían **4,2 millones de años de vida** entre los niños que están vivos hoy en día en virtud de este simple y lógico cambio de política.

Otros Impactos Importantes...

12%


Disminución de nacimientos prematuros

16%

Disminución de casos de SIDS




Mayoría de adultos prefieren que los **21** sean la edad mínima para comprar productos de tabaco




3 de cada **4**

adultos en los EE. UU. **prefieren** que los 21 sean la edad mínima para comprar productos de tabaco



Este dato incluye a **7** de cada **10** fumadores de cigarrillos en los EE. UU. que **prefieren** que los 21 sean la edad mínima para la compra





Tobaco 21

Una ganancia para todos

